



NAJLEPSZA INNOWACJA W PIELĘGNACJI

KIN[®] GINGIVAL

CHLORHEKSYDYNA 0,12% + ALPANTHA[®] (alantoina+panthenol) na dziąsła

Antyseptyczna chlorheksydyna wzmocniona przeciwzapalnymi właściwościami Alpanthy. Dodatkowo rewitalizuje dziąsła.

Wskazania

Stany zapalne i krwawienie dziąseł

Rewitalizuje i pielęgnuje dziąsła

Wspomaga redukcję płytki nazębnej (biofilm-u)

Jako środek antyseptyczny przed i po zabiegu

W terapiach chorób przyzębia

Skuteczność

Chlorheksydyna – Złoty standard w walce z płytką

- Najwyższa skuteczność w porównaniu z innymi środkami.
- Długotrwały efekt: 8 - 12 godzin.
- Stężenie 0,12% oferuje maksymalną skuteczność i minimalne efekty niepożądane (przebarwienia).

Wpływ na dziąsła

Alpantha[®] (związek alantoiny i panthenolu)

- Wzmacnia i koi tkankę dziąsłową.
- Udowodniona skuteczność.
- Przynosi komfort i ulgę.

Dodatkowe

- **Formuła bez alkoholu**
Nie podrażnia, nie wysusza, nie powoduje pieczenia.
- **Doskonały smak**
Zachęca pacjentów do używania.
- **Bezbarwny**
Pozwala kontrolować krwawienie.
- **Pasta**
Wzmacnia działanie płynu Kin Gingival usuwając płytkę nazębną (biofilm). Niska ścieralność.
- **Bez SLS** (laurylosiarczanu sodu), który blokuje działanie chlorheksydyny.

Dawka i sposób użycia:

Czas stosowania: 2-3 tygodnie. Zaleca się użycie **Kin[®] Gingival** na tydzień przed zabiegiem.

Pasta do zębów

Myj zęby przez 2-3 minuty, przynajmniej 2 razy dziennie, najlepiej po każdym posiłku i przed snem.

Płyn do płukania

Płucz jamę ustną rano i wieczorem przez 30 sekund stosując 15 ml nierozcieńczonego płynu.

Nie jedz ani nie pij niczego przez co najmniej 30 minut po zastosowaniu produktu.

Można również rozcieńczyć **Kin[®] Gingival** wodą w stosunku 1:1 lub 2:1 za pomocą irygatora dentystycznego. Nie polykaj.

Zalecamy stosowanie płynu do płukania jamy ustnej **Kin[®] Gingival** jako idealne uzupełnienie pasty **Kin[®] Gingival**.

