

NAJLEPSZA TERAPIA MIEJSCOWA

PERIOKIN®

CHLORHEKSYDYNA 0,20%

Wskazania

Stany zapalne dziąseł i choroby przyzębia

Pooperacyjnie

Po ekstrakcji zęba

Skaling i wygładzanie korzenia

Kiretaż

Implantacja

W przypadkach nadmiernego tworzenia
płytki bakteryjnej

Wrzody jamy ustnej

PERIOKIN® Żel

Skuteczność chlorheksydyny tam, gdzie jest potrzebna.

Wysoka bioadhezyjność.

Żel utrzymuje się na zaaplikowanej powierzchni przez kilka godzin.



Zalety PERIOKIN®

Skuteczność antyseptyczna:

Chlorheksydyna – Złoty standard w walce z płytką

- Najwyższa skuteczność w porównaniu z innymi środkami.
- Stężenie lecznicze: 0,20%. Maksymalna skuteczność.

Formuła bez alkoholu.

Nie podrażnia, nie wysusza, nie powoduje pieczenia.

Doskonały smak.

Zachęca pacjentów do terapii.

Dawka i sposób użycia:

Czas stosowania: 1-2 tygodnie.

Żel PerioKin

Nakładaj żel 2 lub 3 razy dziennie miękką szczoteczką lub wacikiem, wcierając go w dziąsła, lub nałóż żel czystym palcem bezpośrednio na zmienioną powierzchnię, jeśli wymaga tego stan dziąseł.

Spray PerioKin

Zalóż regulowaną dyszę na górę pojemnika. Wyceluj dyszę w miejsce docelowe i naciśnij przycisk. Spryskaj zmienioną powierzchnię 4-5 razy podczas każdego stosowania, 2 lub 3 razy dziennie.

Po zastosowaniu PerioKin

Nie połkaj, nie płucz ust wodą, nie myj zębów, nie jedz ani nie pij niczego przez co najmniej 30 minut po zastosowaniu produktu.

PERIOKIN® Spray

Umożliwia podanie chlorheksydyny do trudno dostępnych miejsc.

- Higieniczny i łatwy w użyciu.
- Idealny do najdalszych zakątków trzecich trzonowców.
- Doskonały na miękkie tkanki.
- Wygoda dla pacjentów w ciągłym ruchu.
- Regulowana dysza 360°.

Wskazania dodatkowe:

- Dla pacjentów niepełnosprawnych
- Dla pacjentów w ciągłym ruchu
- Pacjenci ze szczękostękiem

