

Skład

- Chlorheksydyna 0,20%

Postać farmaceutyczna

- Spray 40 ml

Wskazania do stosowania

- Pooperacyjnie
- Po zabiegach stomatologicznych - ekstrakcja zęba, kiretaż, implantacja, skaling i wygładzanie korzenia
- W chorobach dziąseł i przyzębia - parodontoza, afty, pleśniawki, nadżerki
- W przypadkach nadmiernego tworzenia płytki bakteryjnej

Zalety

- Umożliwia podanie chlorheksydyny do trudno dostępnych miejsc - regulowana dysza 360°
- Doskonały na miękkie tkanki
- Wygodny dla pacjentów w ciągłym ruchu
- Idealny dla pacjentów ze szczękosciskiem
- Nie zawiera alkoholu - nie podrażnia dziąseł, nie wysusza, nie powoduje pieczenia

Sposób użycia

- Otworzyć butelkę i umieścić rurkę aplikatora na dozowniku. Nacisnąć aplikator parę razy, aż dozownik się napełni
- Rozpylanie wykonywane jest poprzez naciśnięcie dozownika i skierowanie strumienia bezpośrednio na wrażliwe miejsce
- Zaleca się wypłukać rurkę aplikatora wodą i osuszyć
- Stosować 4-5 dawek (rozpyleń) na wrażliwe miejsce, 2-3 razy dziennie
- Przez co najmniej pół godziny po zastosowaniu nie zaleca się przyjmowania napojów i pokarmów
- Po użyciu preparatu nie płukać ust wodą

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

